

OASI DI SAN NICOLO'



Antonio Borgo (Naturalista e Zoologo)


LIPU sez. di Venezia



OASI DI SAN NICOLO'

Area piccola e suddivisa in due
porzioni:

una sudoccidentale
più interna, marcatamente forestale
con bosco igrofilo di pioppo bianco,
aree a *Cladium mariscus* e pineta
litoranea (in conversione)



una nordorientale
a contatto col mare, caratterizzata
dalla tipica serie di fitocenosi e
habitat dunali e retrodunali erbacei

OASI DI SAN NICOLO'

„Cenerentola“
per dimensioni e
mancanza delle dune

San Nicolò rimane
fino alla seconda metà
degli anni '90 un fuoriporta
piagato da motocross, rally,
sarchiatura della spiaggia
(Borgo, 1995)

Oggi è (quasi) un gioiello



Foto A. Borgo, 1994

OASI DI SAN NICOLÒ

Il recupero di San Nicolò
deriva da due fattori principali:


- 1) 1997: la posa del cancello
da parte del Comune
- 2) la riduzione degli interventi
di spianamento balneare



OASI DI SAN NICOLÒ'

Il recupero di San Nicolò
deriva da due fattori principali:

- 1) 1997: la posa del cancello
da parte del Comune
- 2) la riduzione degli interventi
di spianamento balneare



OASI DI SAN NICOLO'

1978 - 1994

forte espansione spiaggia (+70 m)

1994 – 2013


ridotta espansione spiaggia (+15/18 m)

forte avanzata vegetazione (+60/140 m)

Effetti:

+ forte aumento della superficie degli habitat di interesse comunitario

■ forte restringimento della profondità dell'area di nidificazione di fraticello e fraticello con conseguente aggravio della „competizione“ con i bagnanti e della predazione



OASI DI SAN NICOLO'

1978 - 1994

forte espansione spiaggia (+70 m)

1994 – 2013


ridotta espansione spiaggia (+15/18 m)

forte avanzata vegetazione (+60/140 m)

Effetti:

+ forte aumento della superficie degli habitat di interesse comunitario

- forte restringimento della profondità dell'area di nidificazione di fraticello e fraticello con conseguente aggravio della „competizione“ con i bagnanti e della predazione



OASI DI SAN NICOLO'

1978 - 1994

forte espansione spiaggia (+70 m)

1994 – 2013

ridotta espansione spiaggia (+15/18 m)

forte avanzata vegetazione (+60/140 m)

Effetti:

+ forte aumento della superficie degli habitat di interesse comunitario

- forte restringimento della profondità dell'area di nidificazione di fraticello e fraticello con conseguente aggravio della „competizione“ con i bagnanti e della predazione



OASI DI SAN NICOLÒ

Al recupero di San Nicolò stanno contribuendo anche interventi sperimentali di miglioramento ambientale (1994):

1) costituzione nucleo di Eriantho-schoeneto (6420)



OASI DI SAN NICOLO'

2) conversione boscaglia ruderale con cenosi di latifoglie termofile litoranee



3) completamento floristico Echinophoro-Ammophileto



OASI DI SAN NICOLO'

Conservazione

Valorizzazione e riduzione
calpestio degli habitat



Conversione
miglioramento pineta



Tutela aree di nidificazione
di Frattino e Fraticello



Contrasto invasione
arbustive alloctone
negli habitat erbacei
retrodunali



OASI DI SAN NICOLO'

Conservazione

Valorizzazione e riduzione
calpestio degli habitat



Conversione
miglioramento pineta



Tutela aree di nidificazione
di Frattino e Fraticello



Contrasto invasione
arbustive alloctone
negli habitat erbacei
retrodunali

